

# OCLUSÃO AORTO-ILÍACA E ISQUEMIA MESENTÉRICA: DIFERENTES ESPECTROS CLÍNICOS, A MESMA ENTIDADE NOSOLÓGICA

Sandrina Figueiredo Braga, Celso Carrilho, Joana Ferreira, Amílcar Mesquita


Serviço de Angiologia e Cirurgia Vascular, Hospital da Senhora da Oliveira, Guimarães, Portugal

\*Contacto Autor: sandrinafigueiredobraga@gmail.com

## *AORTOILIAC OCLUSION AND MESENTERIC ISCHEMIA: DIFFERENT MANIFESTATIONS, THE SAME CLINICAL ENTITY*

Homem de 69 anos, hipertenso, fumador e com cardiomiopatia desenvolveu quadro de dor abdominal, retorragias e perda ponderal (10 kg), acompanhado de parestesias nos pés. Por doença arterial periférica grau III de Leriche-Fontaine e isquemia mesentérica crónica (Fig. 1) foi

submetido a bypass aorto-bifemoral com extensão à artéria mesentérica superior (Fig. 2). Aos 4 anos de seguimento apresenta-se assintomático, com recuperação ponderal e bypass funcionante.



**Figura 1**

TC toraco-abdomino-pélvica. Seta azul-estenose do tronco celíaco; seta amarela-oclusão curta da artéria mesentérica superior; seta vermelha-oclusão aórtica.



**Figura 2**

Bypass aorto-bifemoral e bypass protesico-mesentérica superior.